

喘息治療配合剤

\*1

アドエア 100・250・500ディスクス 1吸入/回、2回/日(成人)、50・125・250エアゾール 2吸入/回、2回/日(成人)  
100ディスクス 1吸入/回、2回/日、50エアゾール 1~2吸入/回、2回/日(小児)

60吸入用 100 ディスクス\*2      250 ディスクス\*3      500 ディスクス\*4      50エアゾール 120吸入用\*5      125エアゾール 120吸入用\*6



28吸入用 100 ディスクス\*2      250 ディスクス\*3      500 ディスクス\*4      250エアゾール 120吸入用\*7



シムビコート タービュヘイラー 30吸入      シムビコート タービュヘイラー 60吸入



1~4吸入/回、2回/日(成人)      1~4吸入/回、2回/日(成人)

- \*1 喘息治療配合剤：ステロイド薬と長時間作用型β<sub>2</sub>刺激薬の配合剤
- \*2 100ディスクス：1吸入 サルメテロール50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル100μg含有
- \*3 250ディスクス：1吸入 サルメテロール50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル250μg含有
- \*4 500ディスクス：1吸入 サルメテロール50μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル500μg含有
- \*5 50エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル50μg含有
- \*6 125エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル125μg含有
- \*7 250エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25μg 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル250μg含有

吸入用ステロイド薬

フルタイド 100~400μg/回、2回/日(成人) 50~100μg/回、2回/日(小児)

50 ディスクス      100 ディスクス      200 ディスクス      50μgエアゾール 120吸入用      100μgエアゾール 60吸入用



50 ロタディスク      100 ロタディスク      200 ロタディスク      ディスクヘイラー



吸入用ステロイド薬

キュバール50 エアゾール



2吸入/回、2回/日(成人)  
1吸入/回、2回/日(小児)

キュバール100 エアゾール



1吸入/回  
2回/日(成人)

アズマネックス ツイストヘイラー 100μg 60吸入



100μg/回、2回/日(成人)

オルベスコ50μg インヘラー112吸入用



オルベスコ100μg インヘラー112吸入用



オルベスコ200μg インヘラー56吸入用



100~400μg/回  
1回/日(成人)

パルミコート100μg タービュヘイラー 112吸入



パルミコート200μg タービュヘイラー 56吸入



パルミコート200μg タービュヘイラー 112吸入



100~400μg/回、2回/日(成人)

パルミコート吸入液 0.25mg      0.5mg



0.25mg/回、2回/日  
または  
0.5mg/回、1回/日  
(6か月以上5歳未満の乳幼児)

副腎皮質ステロイド薬

プレドニゾロン錠 1mg



5~60錠/日、1~4回/日(成人)

プレドニゾロン錠 5mg



1~12錠/日、1~4回/日(成人)

メドロール錠 2mg



2~24錠/日、1~4回/日(成人)

デカドロン錠 0.5mg



1~16錠/日、1~4回/日(成人)

リンデロン錠 0.5mg



1~16錠/日、1~4回/日(成人)








① キサンチン誘導体

<p><b>テオドール錠 50mg</b></p>  <p>4錠/回、2回/日(成人) または8錠/回、1回/日(成人) 2~4錠/回、2回/日(小児)</p>	<p><b>テオドール錠 100mg</b></p>  <p>2錠/回、2回/日(成人) または4錠/回、1回/日(成人) 1~2錠/回、2回/日(小児)</p>	<p><b>テオドール錠 200mg</b></p>  <p>1錠/回、2回/日(成人) または2錠/回、1回/日(成人)</p>	<p><b>テオロング錠 200mg</b></p>  <p>1錠/回、2回/日(成人)</p>
<p><b>スロービッドカプセル 100mg</b></p>  <p>2カプセル/回、2回/日(成人) 1~2カプセル/回、2回/日(小児)</p>	<p><b>スロービッドカプセル 200mg</b></p>  <p>1カプセル/回、2回/日(成人)</p>	<p><b>ユニフィルLA錠 100mg</b></p>  <p>4錠/回、1回/日(成人)</p>	<p><b>ユニフィルLA錠 200mg</b></p>  <p>2錠/回、1回/日(成人)</p>
<p><b>ユニコン錠 400</b></p>  <p>1錠/回、1回/日(成人)</p>	<p><b>ネオフィリン錠 100mg</b></p>  <p>3~4錠/日、3~4回/日(成人) 2~4mg/kg/回、3~4回/日(小児)</p>	<p><b>モノフィリン錠 100mg</b></p>  <p>2~3錠/日、2~3回/日(成人)</p>	<p><b>アストフィリン配合錠</b></p>  <p>1~2錠/回、2~3回/日(成人)</p>

② 交感神経刺激薬

<p><b>セレベント 50 ディスカス</b></p>  <p>50µg/回、2回/日(成人) 25µg/回、2回/日(小児)</p>	<p><b>25 ロタディスク 50 ロタディスク</b></p>  <p>25µg/回、2回/日(成人) 50µg/回、2回/日(成人)</p>	<p><b>ディスクヘラー</b></p> 			
<p><b>ベネトリン 吸入液 0.5%</b></p>  <p>0.3~0.5mL/回(成人) 0.1~0.3mL/回(小児)</p>	<p><b>ベネトリン シロップ 0.04%</b></p>  <p>0.75mL/kg/日 3回/日(乳幼児)</p>	<p><b>サルタノール インハラー 100µg</b></p>  <p>2吸入/回(成人) 1吸入/回(小児)</p>	<p><b>アイロミール エアゾール 100µg</b></p>  <p>2吸入/回(成人) 1吸入/回(小児)</p>	<p><b>ペロテック エロゾル 100</b></p>  <p>2吸入/回(成人)</p>	<p><b>ストメリンド エアゾール</b></p>  <p>1吸入/回(成人)</p>

② 交感神経刺激薬

<p><b>メブチン 10µg エアー 100吸入</b></p>  <p>2吸入/回(成人) 1吸入/回(小児)</p>	<p><b>メブチンキッド 5µg エアー 100吸入</b></p>  <p>4吸入/回(成人) 2吸入/回(小児)</p>	<p><b>メブチン クリックヘラー 10µg</b></p>  <p>2吸入/回(成人) 1吸入/回(小児)</p>	<p><b>メブチン 吸入液 0.01%</b></p>  <p>0.3~0.5mL/回(成人) 0.1~0.3mL/回(小児)</p>	<p><b>メブチン吸入液 ユニット 0.3mL 0.5mL</b></p>  <p>0.3mL/回(成人) 0.1~0.3mL/回(小児)</p>	<p><b>アスプールの液 (1%)</b></p>  <p>0.3mL/回(成人)</p>
<p><b>ホクナリンテープ 0.5mg</b></p>  <p>0.5mg/回、1回/日(0.5~3歳未満)</p>	<p><b>ホクナリンテープ 1mg</b></p>  <p>1mg/回、1回/日(3~9歳未満)</p>	<p><b>ホクナリンテープ 2mg</b></p>  <p>2mg/回、1回/日(成人・9歳以上)</p>	<p><b>ホクナリン錠 1mg</b></p>  <p>1錠/回、2回/日(成人)</p>	<p><b>ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用</b></p>  <p>40mg/kg/日、2回/日(小児)</p>	
<p><b>ベネトリン錠 2mg</b></p>  <p>2錠/回、3回/日(成人) 0.3mg/kg/回、3回/日(小児)</p>	<p><b>ブリカニール錠 2mg</b></p>  <p>2錠/回、3回/日(成人) 1錠/回、3回/日(6歳以上) 1/2錠/回、3回/日(5歳以下)</p>	<p><b>ベラチン錠 1mg</b></p>  <p>1錠/回、2回/日(成人)</p>	<p><b>ベラチンドライシロップ 小児用 0.1%</b></p>  <p>40mg/kg/日、2回/日(小児)</p>		
<p><b>メブチンミニ錠 25µg</b></p>  <p>2錠/回、1~2回/日(成人) 1錠/回、1~2回/日(6歳以上の小児)</p>	<p><b>メブチン錠 50µg</b></p>  <p>1錠/回、1~2回/日(成人)</p>	<p><b>ペロテック錠 2.5mg</b></p>  <p>1錠/回、3回/日</p>			
<p><b>アトック錠 40µg</b></p>  <p>160µg/日、2回/日(成人) 4µg/kg/回、2~3回/日(小児)</p>	<p><b>スピロベント錠 10µg</b></p>  <p>2錠/回、2回/日(成人) 0.3µg/kg/回、2回/日(5歳以上の小児)</p>	<p><b>アトロベント エロゾル 20µg</b></p>  <p>1~2吸入/回 3~4回/日(成人)</p>	<p><b>テルシガン エロゾル 100µg</b></p>  <p>1~2吸入/回 3回/日(成人)</p>		
<p><b>インパール・P カプセル</b></p>  <p>2カプセル/回、3回/日(成人) 1カプセル/回、3回/日(6歳以上の小児)</p>	<p><b>アロテック錠 10mg</b></p>  <p>1錠/回、3回/日(成人)</p>				

③ 副交感神経遮断薬